

フ。臺灣デハ新竹(五指山)、臺中(南投、大雁廬)、臺南カラ報告サレテキルガ遙カ北ノ種子ケ島ニ現ハレタ事ハ注目ニ價スル。支那デハ香港以外ニアマリ知ラレナカツタガ最近 CHIEN PÉI ハ廣東省内ノ Chengkon, Panling-tze 間及ビ Lantau 島デ報告シタ(Sinensia, 7-4 p. 472)。コノ種ハ一見琉球臺灣ニ多イ *Clematis Meyeniana* フ思ハセルガ小葉ハ心臟形ノカハリニ鋭脚デアリ質ガもちのき程モ厚イノデ區別ガツク。

2. *Rubus Grayanus* MAXIMOWICZ in Mém. Biol. 8 p. 382 (1871) りうきういちど、しまあはいちどコレハ八重山、沖縄本島、大島列島、屋久島ニ分布シテキルモノデ、種子ケ島ノ古田官有林ニアツテモ不思議デハナイガ、岩政氏ノ採集シタモノハ一寸型ガ異ツタモノデアツタ。即チ葉ガ非常ニ厚クナツテキテ、MAXIMOWICZ ガ原記載中デ“foliis... subtus pallidis et ad venas petiolisque lamina breviores parce molliter pilosis”ト言ツテキル毛ガ殆ンド無毛ト言ツテヨイ位ニ少ク、平滑ニナツタ品デアル。又コノ標本ニハ若イ直枝ガ添ヘデアツテ、コレニ生ジタ葉ハ三裂片ヲナシ莖ヤ、又稀ニ葉柄ニカナリ鋭イ棘ガアリ、7mm 位ノ長サノ線状ノ托葉ガアル。コレハ MAXIMOWICZ モ期待シナカツタ事デ“Procumbens adnascens inermis...foliis...stipulis nullis...”ト書イテキル。

[昨年十月號ノ訂正] 659 頁 13 行目 *confnsa* ハ *confusa* トナル。

○*Berberis alpicora* C. SCHNEIDER——草木手帖 No. 1 (木村陽二郎)

本年ノ FEDDE, Repertorium novarum regni vegetabilis = SCHNEIDER 氏ハ Neue *Berberis* der Sect. Wallichianae フ書キコレニ 70 種ヲ認メ支那産 16 新種 6 新變種、ビルマ産、4 新種、ブータン産 1 新種、アッサム産 2 新種ヲ書キ臺灣ニ 1938 年 E. H. WILSON ノ採集ニ依ル Arnold Arboretum ノ腊葉ヲ Type トシテ新種 *Berberis alpicora* フ記載シタ。ソシテコノ新種ハ *B. Kawakamii* HAYATA ニ似ルモ葉ハヨリ小サク、ヨリ多數ノ彎入アル鋸齒アリ 4 胚珠ヲ持ツ事ニ依リ異ルトサレ *B. Kawakamii* ノ高山型ナラントサレテキル。氏ハ花ヤ熟セル果ヲ知ラナイ。筆者ハ氏ノ新種ハ *B. morrisonensis* HAYATA ト同一物ト考ヘル。*B. Kawakamii* トテモ記載ニハ 2-3-seed トアルケレドモ東大所藏ノ早田博士ノ圖ニテハ胚珠ハ 3 或ハ 4 個ト記シアリ *B. morrisonensis* デハ 3-seed トアルガ胚珠ノ時ヨリ熟シタ種子ノ數ハ減ズル事ガアリコレニ依ル區別ハ困難デアル。*B. Kawakamii* ト *B. morrisonensis* トノ關係ハ更ニ研究サルベキデアラウ。

Berberis morrisonensis HAYATA, Mater. Fl. Formos. (1911) 25; Icon. Fl. Formos. 1 (1911) 41, t. 10.

Berberis alpicora C. SCHNEIDER in FEDDE, Repert. 46 (1939) 253. syn. nov.

○あふぎばせんとうさう ——草木手帖 No. 2 (木村陽二郎)

阿波神領村ナル同一場所同一日付デ草木研究會會員阿部進一氏ハ小葉ノ切レノ細カイせんとうさうト共ニコノ一品種あふぎばせんとうさうヲ採集サレタ。せんとうさうノ小葉ノ